

(Profilaxis  
previa a la  
exposición)

# PrEP vs. PEP

(Profilaxis  
postexposición)

**PrEP y PEP son medicamentos que te protegen del VIH.**

Toma **PrEP** todos los días, **antes** de posible exposición al VIH y siempre que sea posible que estarás expuesto al VIH.

¿CÓMO  
se toma?

Toma **PEP** en casos de emergencia. Comienza **tan pronto como sea posible** dentro de 72 horas **después** de una exposición al VIH y tómalo a diario durante 28 días.

**Consulta con tu proveedor** sobre **PrEP** o llama la línea directa para salud sexual de NYP al (917) 580-1682  
Lun-Vie 9am-5pm

¿DÓNDE  
lo consigo?

Consulta con tu médico **de inmediato** o llama la línea directa de **PEP** de NYC al (844) 373-7692.

**PrEP** es para las personas que **no tienen el VIH** pero tal vez estarán expuestas en el futuro (como las personas que tienen relaciones sexuales con más de una persona, o que han tenido otra infección de transmisión sexual tal como clamidia).

¿QUIÉN  
podría tomarlo?

**PEP** es para las personas que **no tienen el VIH** pero creen que estuvieron expuestas durante las últimas 72 horas (por ejemplo, por agresión sexual o sexo sin condón).

**RECUERDA:** PrEP y PEP te protegen sólo contra el VIH! Los condones ofrecen protección adicional contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS).